



Cuidados del mes



Preguntas frecuentes sobre reproducción en los felinos

❶ Los gatos y su reproducción. El ciclo sexual en los gatos. Reproducción felina.

PÁGINA 2

Comportamiento animal



Caniche Standard

❶ El perro de raza caniche standard se caracteriza principalmente por su gran capacidad de aprendizaje y obediencia.

PÁGINA 5




Pixie bob

❶ Más del 50% de los pixie bob presentan poli-dactilia, o sea, nacen con un número superior de dedos en las patas (6 a 7 en las delanteras y 5 a 6 en las traseras).

PÁGINA 5

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente •



Razas del mes



Persa

❶ Es tranquilo, de voz suave y muy sociable. Es el típico gato de almohadón.

PÁGINA 6



Bullmastiff


❶ Perro de compañía, seguro, activo, duro y vigilante.

PÁGINA 7



Humor

PÁGINA 4



Encuesta

PÁGINA 7

¿Con qué frecuencia baña a su gato?



Especialistas

PÁGINA 8

Dr. Mario Ricardo Lopez Oliva
Clínica de equinos



Consulte los últimos avisos clasificados

www.clasificadoanimal.com

Perros más felices!

Contra pulgas y garrapatas. para perros y gatos.



PIPETA
fipro
n i l LABYES®

Ninguna dura más.

Preguntas frecuentes sobre reproducción felina

Por M.V. Elida Comercio

¿A qué edad alcanzan los gatitos la pubertad?

La pubertad en los gatos es variable, generalmente ocurre entre los 4 y 12 meses de edad (con mayor frecuencia entre los 6 y 9 meses) y depende de diversos factores como:

- De la época del año en que han nacido, en general la pubertad aparece más precozmente en gatas nacidas a fines de otoño que en las nacidas hacia fines de primavera.
- Del peso corporal (aparece entre 2,3-2,5 Kg.).
- De las horas de luz día; que sean crecientes (foto período) y mayores de 12hs diarias.
- De la raza: Las razas de pelo corto (Siamés, Oriental, Balinés) son más precoces que las de pelo largo (Persa, Birmana). En la hembra Manx suele demorarse hasta los 21 meses.

Los machos son púberes a los 8 - 12 meses de edad, algo más tarde que las hembras.

¿Cómo es el ciclo estral en las gatas?

Las gatas son poliéstricas estacionales, si no quedan preñadas repiten el celo varias veces en su estación reproductiva (primavera - verano), o cuando están expuestas incluso artificialmente a más de 12 hrs. de luz diarias (gatas de departamento), que pueden ciclar todo el año. Otra característica es la ovulación inducida por la cópula, pero está demostrado que hay un 30 % de gatas que ovulan espontáneamente.

¿Cuáles son las fases del ciclo reproductivo de una gata?

En la gatas se pueden reconocer los siguientes fases: proestro, estro, interestro, diestro y anestro.

Durante el proestro que dura solo 1 ó 2 días se observa un cambio de comportamiento: la gata busca ser mimada, puede orinar frecuentemente, vocaliza, fricciona la cabeza y el cuello contra los objetos, gira sobre sí misma, arquea su columna levantando la pelvis y zapatea en el lugar.

El estro se caracteriza por la acentuación de las características anteriores y por la aceptación del servicio. Este período dura de 3 a 14 días con un promedio de 6-7 días. Si no ocurre la ovulación y la hembra está aún dentro de la estación reproductiva de días largos; ocurre un período de inactividad sexual llamado interestro, que dura de 3 a 16 días y la gata vuelve a entrar en proestro nuevamente.

Si ocurre la ovulación, pero no la preñez, comienza el período de diestro o pseudopreñez que dura de 30 a 50 días y si está aún dentro de la estación reproductiva repite el proestro.

Si ocurre la preñez, que dura término medio 65 días y no ocurre la lactancia por muerte de los cachorros, repite el proestro en 3 a 16 días siempre que continúe la época de días largos.

Si todo esto termina en la época en que los días se acortan y las horas de luz son menores a 12 , entra en anestro , o época de reposo sexual que dura de 45 a 150 días dependiendo de la latitud.

¿Como nos damos cuenta de que una gata esta en celo?

En esta especie los únicos signos aparentes son los cambios de conducta, comienza con ronroneos y sonidos característicos diferentes a los habituales; ruedan sobre si mismas, hacen piruetas en el piso, orinan frecuentemente, quieren ser acariciadas, friccionan cabe-

continúa en pagina 3 >>

Toltrazol

Toltrazuril 200 mg

COMPRIMIDOS

Con beneficios únicos para el manejo de criaderos

- Tratamiento y prevención de la coccidiosis
- Práctico: única toma
- Efectivo: rápido efecto barredor

EL COCCIDICIDA DE AMPLIO ESPECTRO



Andrade 2440 - (B1832KSD) Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires. Tel. 4283-2248 / email: info@mayorslab.com.ar
A LA VANGUARDIA DE TRATAMIENTOS PARA COCCIDIOS Y GIARDIAS

za y cuerpo contra objetos, elevan el tren posterior y la cola dejando la vulva al descubierto.

Además la gata doméstica presenta escaso edema y flujo vulvar de aspecto transparente (no sanguinolento), por eso depende de los patrones de comportamiento averiguar el momento del celo.

¿Hasta que edad los gatos y gatas pueden reproducirse?

Tienen aptitud reproductiva hasta los 17 años de edad. En un criadero no más de 6-7 años porque comienzan a tener menos camadas y menos gatitos por camadas, así como gatitos con problemas congénitos.

¿Cuanto dura el servicio en la gata?

Escasos segundos, por este motivo para asegurarnos que ocurrió debemos observar la "rezcción posterior" que consiste en que la gata inmediatamente después del servicio se coloca con sus patas hacia arriba y lo agrade al macho, maúlla y comienza a girar sobre sí misma. Esto dura aproximadamente diez minutos, al cabo de los cuales vuelve a aceptar al macho.

¿A que edad descienden los testículos en el gato?

El descenso de los testículos en los gatos es prenatal. En el caso de los gatos monórquidos (con un solo testículo descendido) lo aconsejable es no utilizarlo como reproductor, ya que el criptorquidismo es altamente heredable. Esta indicada la castración para evitar problemas testiculares en un futuro

¿A que edad es aconsejable castrar a las hembras y los machos...y porque?

Alrededor de los siete meses, edad en que han alcanzado casi la talla del adulto. No se aconseja hacerlo antes, sobre todo en el macho, porque en ese caso no desarrollan bien el pene y uretra peniana, por lo que tienen mayor predisposición a obstrucciones uretrales

¿Cuánto tiempo dura la gestación y cuales son los métodos diagnósticos frecuentes para detectarla?

La gestación promedio en las gatas dura entre 63-65 días. El diagnóstico de preñez se puede comenzar a partir del día 15 de gestación por ecografía o por palpación abdominal a partir del día 17, siendo ésta posible hasta el día 35. Los fetos son visibles por radiografía después del día 40, ya que en este momento sus huesos se están calcificando.

¿Cuáles son los síntomas de parto en la gata?

Podemos predecir el día del parto cuando la temperatura rectal (normal entre 38 y 39°C) baja a menos de 37,2°C.

El parto consta de un primer período de dilatación que va de 12 a 24 hrs., en que la gata esta inquieta, jadea, puede tener vómitos y presenta una vocalización característica. Luego sigue un segundo período de expulsión (haciendo nido), vemos que su abdomen se contrae, hasta la expulsión del primer gatito. Por lo general permanecen



echadas durante este estadio, levantándose intermitentemente solo para cambiar de posición. El trabajo fuerte, con contracciones obvias y molestas suele durar de 5 a 10 minutos. Cuando el feto aparece por la vulva, la gata gira la cabeza para romper las membranas fetales y empezar un vigoroso lamido de su cachorro.

Puede descansar 30-120 minutos entre una expulsión y otra, empleando dicho tiempo para limpiar y amamantar a sus cachorros. Las membranas fetales las puede eliminar después de cada gatito o varias membranas juntas. A veces la gata descansa, come, atiende a sus crías y luego de varias horas continua con el parto. El número de gatitos más frecuente por camada es de 4 a 6.

A veces, después de la expulsión de uno o varios gatitos, la gata puede descansar varias horas e incluso un día, para luego retomar el trabajo de parto y expulsar otro gatito completamente saludable.

¿Cuándo se debe consultar?

A veces; el parto no es normal, ya sea por falta de contracciones, por obesidad o por vejez.

Es aconsejable consultar con su médico veterinario en algunas de las siguientes situaciones:

- Cuando se supero el período normal de gestación y no hay signos de parto.
- Cuando las contracciones duran más de 3 hrs. y no nace un nuevo cachorro.
- Cuando tiene flujo vaginal sin síntomas de parto, o el color es verde o amarillo.
- Cuando la gata tiene poco apetito o esta decaída.

¿Cual es la curva de lactancia de una gata?

En las primeras 24 a 72 hrs. posparto la gata produce calostro, de suma importancia para la transmisión de anticuerpos de la madre a sus hijos. El calostro contiene 88% de agua, 4% de proteínas y 3,4% de grasas. Después de ese período el calostro se cambia gradual-

mente por leche, la cual contiene aprox. 82% de agua, 6,6% de proteínas y 3,4% de grasas. En cuanto al volumen producido, éste se incrementa hasta los 20-30 días, para luego comenzar a disminuir gradualmente, una vez que los gatitos van incorporando otros nutrientes a su dieta.

En el caso de que los cachorros queden huérfanos; ¿cual es la alimentación mas adecuada?

Podría utilizarse una madre sustituta, si es que ésta tiene pocos gatitos, o bien una leche de reemplazo comercial (si es que se puede importar), o una fórmula casera constituida por 1 litro de leche entera, 200 gramos de crema de leche y un huevo batido, ya que la leche de gata posee más proteínas y grasas que la leche de vaca.

¿A que edad abren los ojos los gatitos?

Los gatitos abren los ojos alrededor de los 8 días pero varia desde los 5 y hasta los 14.-

¿A que edad conviene empezar a suministrar algún suplemento alimenticio a la dieta de la madre?

En el último tercio de la gestación y durante la lactancia es conveniente administrar un alimento balanceado para cachorros, ya que tiene más proteínas

¿A que edad es conveniente comenzar a desparasitar a los gatitos?

A los 15 días, junto con su madre

¿A que edad es aconsejable separar los cachorros de su madre?

Después de los 60 días, para que tengan una buena sociabilización.

Autora: M.V. Elida Comercio -Reproducción Felina - Medica Veterinaria. Criadora de las razas Caniche Toy y Yorkshire terrier. Av. Mitre 1545 - Florida - Buenos Aires - Argentina.
TE: 0054 - 011 - 4760 - 1859

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)

Vocabulario veterinario

Significado de términos con letra **A**


- **Aglutinación:** agregación en masas o grupos de las partículas separadas, especialmente la agrupación de bacterias.
- **Aglutinante:** que actua como pegamento.
- **Aglutinina:** cualquier sustancia que produzca aglutinación celular, sobre todo, los anticuerpos especificos que se forman en la sangre como respuesta a un agente invasor.
- **Aglutinogeno:** sustancia (antígeno) que estimula al cuerpo a producir anticuerpos aglutinantes.
- **Agonista:** músculo al que se opone otro (antagonista) cuando se contrae para mover alguna parte.

Humor / Burocracia

Estaban un contador, un arquitecto, un químico y un burócrata discutiendo sobre cual de sus perros era el mas listo. Entonces se les ocurrió ponerles a prueba...

El arquitecto llama a su perro -COMPAS- has lo que sabes, y el perro tomo un pliego de papel milimétrico un lápiz y una regla y dibujó un cuadrado perfecto. Después el contador llamo a su mascota -INVENTARIO- muéstrales, el perro fue por un paquete de galletas y las dividió y acomodo en tres pilas con el mismo numero de piezas a este.

Le siguió el químico que llamó a su perro: -MATRAZ- has lo tuyo y el perro tomó un recipiente con leche y una taza graduada y midió exactamente 1/2 litro. Cuando tocó el turno al Burócrata todos estaban atentos a ver que hacia su perro entonces lo llamó -SENA-DOR- y el perro sin mas fue y se echó sobre el pliego de papel, bebió la leche de un solo trago y se zampó todas las galletas.



RETRATOS DE MASCOTAS

www.francisdeblas.com

Galga con mantilla
óleo

Caniche Standard

Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

El perro de raza caniche standard se caracteriza principalmente por su gran capacidad de aprendizaje y obediencia, ya que se encuentra en uno de los lugares más altos del ranking en lo que respecta a ambas características. Si bien esto es conocido para muchas personas, no todos saben que el perro de raza caniche standard es un buen guardián del hogar: ladra con seguridad ante la presencia de extraños.

Particularidades del comportamiento de la raza de perro caniche standard

El perro de raza caniche standard es un perro bastante afectuoso y amante del juego, lo que lo convierte en una raza altamente recomendable para hogares donde haya chicos. Si bien no es un perro muy destructivo los ejemplares de la raza caniche standard suelen presentar un elevado nivel de actividad. Su dueño deberá estar dispuesto a brindarle oportunidades de hacer ejercicio en forma cotidiana, sobre todo si vive en lugares no muy amplios, poco adecuados para los perros de raza caniche standard.

www.foyel.com 



Pixie Bob

Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

El gato de raza pixie bob es de tamaño mediano a grande y presenta un cuerpo largo y fuerte. La cabeza del gato de raza pixie bob es larga y la frente prominente. El hocico es largo y ancho y la barbilla es fuerte. El gato de raza pixie bob presenta orejas de base ancha, redondeadas en las extremidades y con los mechones característicos de los lince. Sus ojos son ovalados y de color en armonía con el pelaje. La mirada salvaje en la cara es esencial en la singularidad del gato de raza pixie bob.

El único color aceptado y el modelo es el atigrado manchado castaño.

Más del 50% de los gatos de raza pixie bob presentan polidactilia, o sea, nacen con un número superior de dedos en las patas (6 a 7 en las delanteras y 5 a 6 en las traseras).

Una de las primeras particularidades del comportamiento de la raza pixie bob es que se la referida a su sociabilidad. En general se menciona al gato de raza pixie bob como el "perro de los gatos" porque los ejemplares de la raza pixie bob no sólo suelen ser muy afectuosos y leales a su familia, sino que hasta pueden ser entrenados para pasear collar y correa. Además si son bien estimulados desde pequeños es frecuente verlos viajar tranquilamente en coche.

Si bien el gato de raza pixie bob suele ser listo, independiente y buen cazador, usualmente prefiere los consuelos de casa a la llamada de lo salvaje. En general es un gato manso que convive muy bien con los niños y con otras mascotas. Los ejemplares de la raza de gato pixie bob suelen disfrutar de la vida en un departamento y en general no tienen hábitos destructivos.

En resumen, el gato de raza pixie bob suele ser fiel, tranquilo y afectuoso; todas características importantes a la hora de decidir incorporar un miembro no humano a la familia.

www.foyel.com 

Especialistas / Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

- Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento

Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605

www.comportamientoanimal.com

Persa

📄 Fuente: www.foyel.com

Origen: La raza Persa proviene del antiguo reino de Persia (Irán) y Turquía. En 1700 es llevado a Italia y en el 1800 a Francia e Inglaterra. Posiblemente desciende de la raza Angora Turco.

Descripción

Estructura: De tipo pesado, cobby o compacto, con gran musculatura y grandes huesos.

Cabeza: La cabeza del Persa es característica por su nariz que se ha acortado exageradamente (por selección genética) hasta extremos peligrosos para su salud. Su cabeza en general es redondeada y posee orejas pequeñas y bien separadas.

Pelo: El pelo del Persa es de tipo largo (por gen l de pelo largo y además por selección de poligenes alargadores) suave y muy denso por tener también muy largo el subpelo o pelo secundario.

Color del manto: Se pueden clasificar en distintos tipos de coloración; a) colores uniformes o sólidos como negro, azul, brown, rojo, blanco etc., b) bicolores formados por el blanco y otro color uniforme (en las hembras se puede transformar en tricolor con el agregado del rojo al blanco y negro), c) sombreados (gen i) en sus variantes chinchilla, sombreado y ahumado (estos tienen la base del pelo blanco y distinta extensión de la punta con color), d) tabbys o atigrados, con todas las variantes del gen T (rayados, manchados, marmolados etc.). Dependiendo de la asociación de criadores, se incluye o no la coloración siamés, la cual desarrollaremos aparte como raza Himalayo.

Ojos: Son grandes y redondos. De color amarillo ana-



ranjado (cobre) en la mayoría de los colores del manto, verdes en los sombreados, azul en el blanco.

ALTERACIONES GENÉTICAS MÁS FRECUENTES:

Alteraciones faciales, mandibulares y oftálmicas por el extremo acortamiento de la cara.

Cataratas. Degeneración Retiniana progresiva tipo 1.

Prolapso de la glándula del tercer párpado. Queratitis

Riñón poliquístico (PKD en inglés)

Displasia de cadera

Tesaurosia: Manosidosis

Síndrome de Chediak-Higashi (gen ch productor de inmunodeficiencia genética) ligado al color azul ahumado. Pertenecen al grupo de mediano riesgo por el tipo sanguíneo B.

Utilización

Caracter: Como todo gato de pelo largo es generalmente pasivo, tranquilo, de voz suave y muy sociable. Es el típico gato de almohadón.

Agradecemos la colaboración de: Rubén M. Gatti M.V. - Bustamante 2476 - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
TEL: +54 - 11 - 4801-3161 - e-mail: gattiedo@speedy.com.ar

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Presentamos el nuevo
Purina® Pro Plan® Puppy
OptiStart Plus con
calostro natural.

"Protegé a tu cachorro
como su madre lo hizo"

La última tecnología en protección de cachorros.



Bullmastiff

 Fuente: www.foyel.com

Descripción: El temperamento del Bullmastiff es una mezcla de perro de compañía, seguro, activo, duro y vigilante.

ASPECTO: Se trata de un perro de extraordinaria potencia en su construcción, simétrico, que hace patente su fuerza sin resultar pesado.

CABEZA Y CRÁNEO: El cráneo deberá de ser grande, fuerte y cuadrado visto desde cualquier ángulo, con unas arrugas que se apreciarán cuando muestre interés, pero que no se harán patentes cuando el animal esté en actitud de reposo. La circunferencia del cráneo deberá ser igual a la altura del perro medida hasta la cruz; el cráneo será además ancho, profundo, con unas mejillas bien marcada. El hocico será corto y la medida de la trufa al stop será de aproximadamente un tercio de la distancia de la trufa hasta el centro del occipital, muy amplio bajo los ojos y siguiendo casi en paralelo en anchura hasta el final; cortado en forma cuadrada, formará un ángulo recto con la línea superior de la cara, resultando a la vez proporcionado con respecto al conjunto del cráneo.

La mandíbula inferior es ancha hasta su extremo y la nariz amplia, con unas narinas bien abiertas cuando se mira de frente. Además será plana, no puntiaguda y no parecerá retroceder cuando se mire de perfil. Los belfos no deberán colgar por debajo del nivel de la propia base de la mandíbula inferior. El stop deberá estar perfectamente definido.

OREJAS: En forma de "V" o formando un pliegue hacia atrás, se insertarán altas y bien separadas, dando un aspecto cuadrado al conjunto con el cráneo. Serán pequeñas y más oscuras que el color del pelo y la punta deberá estar al nivel del ojo cuando el perro esté atento. Las orejas en forma de rosa serán consideradas defecto grave.

CUELLO

Bien arqueado, de longitud moderada, muy musculoso y de igual circunferencia que el cráneo.

EXTREMIDADES ANTERIORES: Pecho ancho y profundo, bien descendido entre las patas anteriores; hombros musculados, oblicuos y potentes pero no sobrecargados. Las patas delanteras serán potentes y derechas, con buena estructura ósea y separadas entre sí, presentando la parte delantera recta. Los antebrazos serán rectos y fuertes.



CUERPO: Dorso corto y recto, con un porte compacto pero no tanto como para perjudicar al animal en su actividad. El dorso de carpa o ensillado se considerará defecto muy grave.

COLOR: Se admite cualquier tonalidad leonada, desde el arena hasta el rojo profundo y de igual manera se admitirá el color atigrado, siempre y cuando sean colorees puros y si mezcla de pelo negro. Se permite una pequeña mancha de blanco sobre el pecho (siempre y cuando no sea más grande que el tamaño de una mano abierta). Cualquier otra mancha blanca se considerará falta grave. El hocico oscuro es esencial, aclarándose hacia los ojos y con marcas negras bien definidas alrededor de éstos, lo que le confiere al animal su particular expresión característica de la raza. Las uñas serán preferentemente, oscuras.


PESO Y TALLA: Los machos tendrán una altura a la cruz de 63 a 69 cm y las hembras de 61 a 66 cm. Los machos pesarán entre 50 y 60 kg. y las hembras entre 40 y 50 kg. A igualdad de condiciones se puntuará al ejemplar de mayor peso. Es preciso recordar que el peso y la talla deberán ser proporcionales entre sí.



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Encuesta del mes/

¿Con qué frecuencia baña a su gato?



Total de votos: 2915

Avisos Clasificados / Consultá el texto completo de los avisos en www.clasificadoanimal.com

CATEGORIA	TÍTULO DEL ANUNCIO	PUBLICACIÓN
Se regalan	se regalan cocker	03.03.2008
Chihuahua	Bello Chihuahua	03.03.2008
En adopcion	gatitos negros 45 días en adopcion	03.03.2008
Bosque de Noruega	Primer Criadero Bosques Vikingos	03.03.2008
Beagle	Criadero de Beagle Tres Clavos	02.03.2008
Boxer	Se venden Cachorros Boxer	02.03.2008
Bullterrier	Se vende bull terrier hembra tricolor	02.03.2008
Paseadores	Paseador óptima idoneidad paseos caninos	02.03.2008
Se venden	Se venden cachorros caniche toy blanco	02.03.2008

ESPACIO PUBLICITARIO

Especialistas / Endocrinología veterinaria

**M.V. Jorge Daniel García**

- **Especialidad en endocrinología veterinaria, con Intensificación en Clínica de Pequeños Animales**

- Medico Veterinario de Planta Unidad de Endocrinología Veterinaria – Hospital Escuela Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad de Buenos Aires Argentina.
- Miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo.
- Curso de Educación Diabetología - Hospital Escuela Fac. Cs Vet. U.B.A - Inicio Noviembre 2006, el primer jueves de cada mes.
- Ateneo Manejo del paciente Cetoacidótico Diabético – Av. San Martín 542 – Capital Federal – Buenos Aires - 31 de mayo de 2007.

Atención profesional: Teléfono: 54-11- (15) - 5826 - 9180

- Servicio de Endocrinología Veterinaria - Veterinaria Maure - Av. Cabildo 428 TE (solicitar turno): 54 11 4772 0152.
- Servicio de Endocrinología Veterinaria - Veterinaria Nocturna Morón - San Martín 592 - TE (solicitar turno): 54 11 4629 6044.
- Servicio de Endocrinología Veterinaria - Hospital Veterinario Central - Paunero 2717 - TE (solicitar turno): 54 11 4802 6837.

notivet[®]www.foyel.com

Informes/ 54 - 02944 - 43 - 7982 Bariloche - Río Negro - Argentina. Copyright® 1997 - 2008. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Editor.

Propiedad intelectual/ Hecho el deposito dispuesto por la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el Nº 442.931.

Editor Responsable/

M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio www.foyel.com. Presentes en Internet desde 1997.

Contenidos/

Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.

Publicidad/

Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: foyel@speedy.com.ar con el Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.

Diseño y diagramación de Notivet - versión PDF/

Estudio EQUION :: gráfica + multimedia - www.equion.com.ar - equion@equion.com.ar - (03543) 401017 - Córdoba - Argentina

Hasta el próximo número

No se olvide de recomendar esta Revista Digital a sus amigos y conocidos